

**ΧΗΜΕΙΑ**  
**ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ**  
**23 ΜΑΪΟΥ 2011**  
**ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ**

**ΘΕΜΑ Α**

Για τις ερωτήσεις **A1** έως και **A4** να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

- A1.** Το στοιχείο που περιέχει στη θεμελιώδη κατάσταση τρία ηλεκτρόνια στην 2p υποστιβάδα έχει ατομικό αριθμό:

- α.** 5
- β.** 7
- γ.** 9
- δ.** 15

**Μονάδες 5**

- A2.** Από τα παρακάτω ανιόντα, ισχυρότερη βάση κατά Brönsted-Lowry είναι:

- α.**  $\text{HCOO}^-$
- β.**  $\text{NO}_3^-$
- γ.**  $\text{Cl}^-$
- δ.**  $\text{ClO}_4^-$

**Μονάδες 5**

- A3.** Από τα παρακάτω διαλύματα, μεγαλύτερη ρυθμίστική ικανότητα έχει:

- α.**  $\text{CH}_3\text{COOH}$  0,1M –  $\text{CH}_3\text{COONa}$  0,1M
- β.**  $\text{CH}_3\text{COOH}$  0,01M –  $\text{CH}_3\text{COONa}$  0,01M
- γ.**  $\text{CH}_3\text{COOH}$  0,5M –  $\text{CH}_3\text{COONa}$  0,5M
- δ.**  $\text{CH}_3\text{COOH}$  1,0M –  $\text{CH}_3\text{COONa}$  1,0M

**Μονάδες 5**

- A4.** Ο δεσμός μεταξύ του 2<sup>δυ</sup> και του 3<sup>δυ</sup> ατόμου άνθρακα στην ένωση  $\text{HC}\equiv\text{C}-\text{CH}=\text{CH}_2$  δημιουργείται με επικάλυψη ψβριδικών τροχιακών:

- α.**  $\text{sp}^3 - \text{sp}^3$
- β.**  $\text{sp} - \text{sp}^2$
- γ.**  $\text{sp}^2 - \text{sp}^3$
- δ.**  $\text{sp}^3 - \text{sp}$

**Μονάδες 5**

- A5.** Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας στο τετράδιό σας δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση τη λέξη **Σωστό**, αν η πρόταση είναι σωστή, ή **Λάθος**, αν η πρόταση είναι λανθασμένη.

- α.** Οι τομείς s και p του περιοδικού πίνακα περιέχουν 2 και 6 ομάδες αντίστοιχα.
- β.** Ο αριθμός τροχιακών σε μία υποστιβάδα, με αζυμουθιακό κβαντικό αριθμό **l**, δίνεται από τον τύπο:  $2l + 1$ .
- γ.** Το pH υδατικού διαλύματος  $\text{NaOH}$  συγκέντρωσης  $10^{-8}$  M είναι 6.
- δ.** Κατά την προσθήκη  $\text{HCl}$  στο προπίνιο, προκύπτει ως κύριο προϊόν το 1,2-διχλωροπροπάνιο.
- ε.** Κατά την προσθήκη  $\text{Na}$  σε αιθανόλη, παρατηρείται έκλυση αερίου.

**Μονάδες 5**

## ΘΕΜΑ Β

B1. Δίνονται τα άτομα/ιόντα:  $^{12}\text{Mg}^{2+}$ ,  $^{15}\text{P}$ ,  $^{19}\text{K}$ ,  $^{26}\text{Fe}^{2+}$ .

- Να γράψετε τις ηλεκτρονιακές δομές τους (κατανομή ηλεκτρονίων σε υποστιβάδες). (μονάδες 4)
- Να γράψετε τον αριθμό των μονήρων ηλεκτρονίων που περιέχει καθένα από τα άτομα/ιόντα:  
 $^{15}\text{P}$ ,  $^{19}\text{K}$ ,  $^{26}\text{Fe}^{2+}$  (μονάδες 3)

B2. Να αιτιολογήσετε τις επόμενες προτάσεις:

- Η 1<sup>η</sup> ενέργεια ιοντισμού του  $^{17}\text{Cl}$  είναι μεγαλύτερη από την 1<sup>η</sup> ενέργεια ιοντισμού του  $^{16}\text{S}$ .
- Η αντίδραση:  $\text{HNO}_3 + \text{F}^- \rightleftharpoons \text{NO}_3^- + \text{HF}$ , είναι μετατοπισμένη προς τα δεξιά.
- Κατά την αραίωση ρυθμιστικού διαλύματος σε σχετικά μικρά όρια, το pH του διατηρείται πρακτικά σταθερό.
- Το pH στο ισοδύναμο σημείο, κατά την ογκομέτρηση διαλύματος  $\text{NH}_3$  με πρότυπο διάλυμα  $\text{HCl}$ , είναι μικρότερο του 7.
- Κατά την προσθήκη  $\text{HCN}$  σε καρβονυλική ένωση και στη συνέχεια υδρόλυση του προϊόντος, προκύπτει 2-υδροξυοξύ.

Μονάδες 7


B3. Κάθε μία από τις ενώσεις:  $\text{HCH=O}$ ,  $\text{HCOOH}$ ,  $\text{CH}_3\text{CH=O}$  και  $\text{CH}_3\text{COOH}$ , περιέχεται αντίστοιχα σε τέσσερις διαφορετικές φιάλες.

Πώς θα ταυτοποιήσετε την ένωση που περιέχεται σε κάθε φιάλη, αν διαθέτετε μόνο τα εξής αντιδραστήρια: α. αντιδραστήριο Fehling, β. διάλυμα  $\text{I}_2$  παρουσία  $\text{NaOH}$ , γ. όξινο διάλυμα  $\text{KMnO}_4$ . Να γράψετε τις παρατηρήσεις στις οποίες στηριχτήκατε για να κάνετε τις παραπάνω ταυτοποιήσεις.

Μονάδες 8

## ΘΕΜΑ Γ

**Γ1.** Δίνονται οι παρακάτω χημικές μετατροπές:



Να γράψετε τους συντακτικούς τύπους των οργανικών ενώσεων  $A$ ,  $B$ ,  $\Gamma$ ,  $\Delta$ ,  $E$ ,  $Z$ ,  $\Theta$ .

**Μονάδες 14**

- Γ2.** Διαθέτουμε ομογενές μείγμα δύο αλκοολών του τύπου  $C_3H_8O$ . Το μείγμα χωρίζεται σε δύο ίσα μέρη.
- Το  $1^\circ$  μέρος αντιδρά με περίσσεια διαλύματος  $I_2 + NaOH$  και δίνει 78,8 g κίτρινων ιζήματος.
  - Το  $2^\circ$  μέρος απαιτεί για την πλήρη οξείδωσή του 3,2L διαλύματος  $KMnO_4$  0,1M παρουσία  $H_2SO_4$ .

Να βρεθούν τα μολτών συστατικών του αρχικού μείγματος.

Δίνεται:  $M_r(CH_3)=394$

**Μονάδες 11**

## ΘΕΜΑ Δ

Διαθέτουμε υδατικά διαλύματα  $\text{CH}_3\text{COONa}$  0,1M (διάλυμα A) και  $\text{NaF}$  1M (διάλυμα B).

Δ1. Να υπολογιστεί το pH του διαλύματος A.

Μονάδες 4

Δ2. Πόσα mL  $\text{H}_2\text{O}$  πρέπει να προσθέσουμε σε 10 mL του διαλύματος A, για να μεταβληθεί το pH του κατά μία μονάδα;

Μονάδες 6

Δ3. Πόσα mL διαλύματος  $\text{HCl}$  0,01M πρέπει να προσθέσουμε σε 10 mL διαλύματος A, για να προκύψει ρυθμιστικό διάλυμα με  $\text{pH} = 5$ ;

Μονάδες 6

Δ4. 10 mL του διαλύματος A αναμειγγύονται με 40 mL του διαλύματος B και προκύπτουν 50 mL διαλύματος Γ. Να υπολογιστεί το pH του διαλύματος Γ.

Μονάδες 9

Δίνεται ότι:

- Όλα τα διαλύματα βρίσκονται σε θερμοκρασία  $\theta = 25^\circ\text{C}$ ,  $K_{\text{a}(\text{CH}_3\text{COOH})} = 10^{-5}$ ,  $K_{\text{a}(\text{HF})} = 10^{-4}$ ,  $K_w = 10^{-14}$
- Τα δεδομένα του προβλήματος επιτρέπουν τις γνωστές προσεγγίσεις.

ΕΡΩΤΗΣΗ  
ΑΟΥΓΑΝΑ