




ΧΗΜΕΙΑ
ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ
6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014
ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΘΕΜΑ Α

Για τις προτάσεις **A1** έως και **A5** να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της πρότασης και, δίπλα, το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή επιλογή.

- A1.** Από τις παρακάτω αλκοόλες **δεν** αφυδατώνεται προς αλκενίο η
- $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{OH}$



Μονάδες 5

- A2.** Με προσθήκη νερού σε αλκίνιο, πάροντας Hg , HgSO_4 και H_2SO_4 , μπορεί να παραχθεί

- μόνο κετόνη
- καρβονυλική ένωση
- κυανιδρίνη
- αλκοόλη.

Μονάδες 5

- A3.** Από όλα τα στοιχεία της $2^{\text{ης}}$ περιόδου του περιοδικού πίνακα τη χαμηλότερη τιμή ενέργειας $1^{\text{ης}}$ ιοντισμού (E_{ii}) έχει

- το αλκάλιο
- η αλκαλική γαία
- το αλογόνο
- το ευγενές αέριο.

Μονάδες 5

- A4.** Το χημικό στοιχείο X με ηλεκτρονιακή δομή $[\text{Ar}]3d^{10}4s^24p^5$ ανήκει στην

- $4^{\text{η}}$ περίοδο και στην $7^{\text{η}}$ ομάδα του περιοδικού πίνακα
- $4^{\text{η}}$ περίοδο και στην $17^{\text{η}}$ ομάδα του περιοδικού πίνακα
- $5^{\text{η}}$ περίοδο και στην $4^{\text{η}}$ ομάδα του περιοδικού πίνακα
- $4^{\text{η}}$ περίοδο και στην $5^{\text{η}}$ ομάδα του περιοδικού πίνακα.

Μονάδες 5

- A5.** Όξινο διάλυμα είναι το διάλυμα του
- CH₃COONa 0,1 M
 - CH₃NH₃Cl 0,1 M
 - KCN 0,1 M
 - NaCl 0,1 M

Μονάδες 5

ΘΕΜΑ Β

- B1.** Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας στο τετράδιό σας δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση, τη λέξη **Σωστό**, αν η πρόταση είναι σωστή, ή **Λάθος**, αν η πρόταση είναι λανθασμένη.
- Το ¹⁷Cl σχηματίζει ενώσεις με ένα μόνο ομοιοπολικό δεσμό.
 - Διάλυμα NaHSO₄ 0,1 M έχει pH > 7 στους 25°C.
 - Διάλυμα NaHCO₃ 1 M και Na₂CO₃ 1 M είναι ρυθμιστικό διάλυμα.
 - Στην ένωση CH₂=CH-CH=CH₂ όλα τα άτομα του άνθρακα έχουν sp² υβριδικά τροχιακά.
 - Η προσθήκη HCN σε καρβονυλική ένωση **είναι** αντίδραση ανοικοδόμησης.

Μονάδες 10

- B2.** a. Να αναφέρετε δύο διαφορές μεταξύ του σ και του π δεσμού. (μονάδες 4)
- β. Οι τέσσερις πρώτες ενέργειες ιοντισμού ενός στοιχείου είναι αντίστοιχα
- $$E_{i1} = 738 \text{ kJ/mol}$$
- $$E_{i2} = 1450 \text{ kJ/mol}$$
- $$E_{i3} = 7,7 \cdot 10^3 \text{ kJ/mol}$$
- $$E_{i4} = 1,1 \cdot 10^4 \text{ kJ/mol}$$
- Σε ποια ομάδα του περιοδικού πίνακα ανήκει το στοιχείο αυτό και γιατί; (μονάδες 4)
- γ. Δίνεται πρωτολυτικός δείκτης ΗΔ με pK_a = 5. Αν ο δείκτης προστεθεί σε ένα διάλυμα χυμού μήλου, που έχει pH = 3, τι τιμή θα έχει ο λόγος [Δ] / [ΗΔ]; Με δεδομένο ότι η όξινη μορφή του δείκτη έχει χρώμα κόκκινο και η βασική κίτρινο, τι χρώμα θα αποκτησει το διάλυμα. (μονάδες 3)
- δ. Διάλυμα άλατος NH₄A έχει pH = 8. Με δεδομένο ότι η K_b της NH₃ είναι 10⁻⁵ να εξετάσετε αν η τιμή K_a του ΗΑ είναι μεγαλύτερη, μικρότερη ή ίση του 10⁻⁵. Δίνεται K_w = 10⁻¹⁴ (μονάδες 4)


Μονάδες 15

ΘΕΜΑ Γ

- Γ1.** a. Σε ένα δοχείο περιέχεται 1-πεντίνιο ή 2-πεντίνιο. Πώς θα διαπιστώσετε ποια από τις 2 ουσίες περιέχεται στο δοχείο; (μονάδες 2)
- β. Σε δύο δοχεία περιέχονται μεθανικός μεθυλεστέρας (HCOOCH₃) και αιθανικός αιθυλεστέρας (CH₃COOCH₂CH₃). Δεν ξέρουμε όμως σε ποιο δοχείο περιέχεται η κάθε ουσία. Πώς θα διαπιστώσετε σε ποιο δοχείο περιέχεται η καθεμία; (μονάδες 4)
- (Και στα δύο παραπάνω ερωτήματα να γράψετε τις χημικές εξισώσεις που τεκμηριώνουν την απάντησή σας).

Μονάδες 6

Γ2. Δίνεται το παρακάτω διάγραμμα χημικών διεργασιών.



Με δεδομένο ότι η ένωση Θ αλλάζει το χρώμα οξινού διαλύματος $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ από πορτοκαλί σε πράσινο, να γράψετε τους συντακτικούς τύπους των ενώσεων A , B , Γ , Δ , Ζ και Θ .

Μονάδες 7

Γ3. Ομογενές μίγμα δύο κορεσμένων μονοσθενών αλκοολών (A) και (B) μάζας 44,4 g χωρίζεται σε τρία ίσα μέρη.

- Στο 1° μέρος προσθέτουμε περισσεια Na , οπότε ελευθερώνονται 2,24 L αερίου σε πρότυπες συνθήκες (stp).
- Στο 2° μέρος προσθέτουμε περισσεια SOC_{2} και στα οργανικά προϊόντα που προκύπτουν επιδρούμε με Mg σε απόλυτο αιθέρα. Στη συνέχεια προσθέτουμε νερό, οπότε προκύπτει ένα (1) μόνο οργανικό προϊόν.
- Στο 3° μέρος προσθέτουμε διάλυμα I_2/NaOH , οπότε καταβυθίζονται 0,05 mol κίτρινου ιζήματος.

Να προσδιορίσετε το συντακτικό τύπο και την ποσότητα σε mol της κάθε αλκοόλης στο αρχικό μίγμα.

Δίνονται: $\text{Ar}(\text{H}) = 1$, $\text{Ar}(\text{C}) = 12$, $\text{Ar}(\text{O}) = 16$

Μονάδες 12

ΘΕΜΑ Δ

Σε πέντε δοχεία περιέχονται τα επόμενα διάλυμα:


- διάλυμα NaNO_3 0,1 M (Y1)
- διάλυμα NH_3 0,1 M (Y2)
- διάλυμα HCl 0,1 M (Y3)
- διάλυμα NaOH 0,1 M (Y4)
- διάλυμα NH_4Cl 0,1 M (Y5)

Δ1. Να βρείτε ποιο διάλυμα περιέχεται σε κάθε δοχείο με βάση τα δεδομένα του παρακάτω πίνακα

| Δοχείο | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|--------|---|---|---|----|----|
| pH | 1 | 5 | 7 | 11 | 13 |

Μονάδες 5

Δ2. Το κυριότερο οξινό συστατικό του ξινισμένου γάλακτος είναι το γαλακτικό οξύ



- a. Για την ογκομέτρηση 10 mL του ξινισμένου γάλακτος απαιτούνται 5 mL διαλύματος NaOH 0,1 M. Να υπολογίσετε τη συγκέντρωση του γαλακτικού οξέος

στο ξινισμένο γάλα (κανένα άλλο συστατικό του γάλακτος δεν αντιδρά με NaOH).

(μονάδες 3)

- β. Να προτείνετε από μία εργαστηριακή δοκιμασία για την ανίχνευση της καρβοξυλομάδας και της υδροξυλομάδας του γαλακτικού οξέος.
(Να γράψετε τις σχετικές χημικές εξισώσεις).

(μονάδες 2)
Μονάδες 5

- Δ3.** Με ποια αναλογία όγκων πρέπει να αναμείξουμε το διάλυμα Y4 (NaOH) με το διάλυμα Y5 (NH₄Cl), ώστε να προκύψει ρυθμιστικό διάλυμα (Y6) με pH = 9.

Μονάδες 9

- Δ4.** Σε ίσους όγκους V των διαλυμάτων
Y2 (NH₃ 0,1 M)
Y4 (NaOH 0,1 M)
Y6 (NH₃ / NH₄Cl)

προστίθεται νερό όγκου x L, y L, ω L αντίστοχα, ώστε να μεταβληθεί το pH τους κατά μία μονάδα. Να διατάξετε κατά αύξουσα σειρά τις τιμές x , y , ω και να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.

Μονάδες 6

- Τα δεδομένα του προβλήματος επιτρέπουν τις γνωστές προσεγγίσεις.
- Δίνονται $K_w = 10^{-14}$ και $\theta = 25^\circ\text{C}$.

ΕΡΩΤΗΣΗ ΑΩΓΗΝΑ
ΕΡΩΤΗΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ
ΕΡΩΤΗΣΗ ΘΡΗΣΚΕΙΑΣ