

**ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ' ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ Δ' ΤΑΞΗΣ  
ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β')  
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017 – ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ:  
ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ**

**ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ**

**ΘΕΜΑ Α**

- A1. β  
A2. γ  
A3. β  
A4. γ  
A5. δ

**ΘΕΜΑ Β**

- B1. α) 9  
β) 5  
γ) 7  
δ) 1  
ε) 2  
στ) 4  
ζ) 6  
η) 3

**B2.**    **A** → αποικοδομητές

**B** → αζωτοδεσμευτικά βακτήρια

**Γ** → νιτροποιητικά βακτήρια

**Δ** → απονιτροποιητικά βακτήρια

**B3.**    Βλέπε σχολικό βιβλίο σελ.126: « Η διαδικασία με την οποία ... φυσική επιλογή».

Βλέπε σχολικό βιβλίο σελ.129: «Ένα από τα σημεία ... μπορεί να εξελιχθεί».

**B4.**    Βλέπε σχολικό βιβλίο σελ.41: « Για την εμφάνιση των κλινικών συμπτωμάτων ... βλεννογόνων αδένων».

## ΘΕΜΑ Γ

### Γ1.

ΤΡΟΦΙΚΑ ΕΠΙΠΕΔΑ	BIOMAZA (kg)	ΠΟΣΟΤΗΤΑ DDT (mg)	ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ DDT (mg/kg)
Κατ. 2 <sup>ης</sup> τάξης	$10^4$	$10^6$	$10^6 / 10^4 = 100$
Κατ. 1 <sup>ης</sup> τάξης	$10^5$	$10^6$	$10^6 / 10^5 = 10$
Παραγωγοί	$10^6$	$10^6$	$10^6 / 10^6 = 1$

### Γ2.

- Το φαινόμενο ονομάζεται βιοσυσσώρευση.
- Ορισμός: Βλέπε σχολικό βιβλίο σελ.110,2<sup>η</sup> παράγραφος: « Το φαινόμενο αυτό ... βιοσυσσώρευση».
- Το DDT προκαλεί το φαινόμενο αυτό γιατί ανήκει στις μη βιοδιασπώμενες ουσίες.

Βλέπε σχολικό βιβλίο σελ 109, 110: « Οι πιο τοξικοί όμως ρυπαντές ... που είναι ο τελικός καταναλωτής».

**Γ3.** Ποσοστό απώλειας ενέργειας: 90%

Βλέπε σχολικό βιβλίο σελ.77: « Έχει υπολογιστεί ότι μόνο το 10% ... συνεπώς μειώνεται η βιομάζα του».

**ΘΕΜΑ Δ**

**Δ1.** Πρωτογενή λεμφικά όργανα: θύμος αδένας, ερυθρός μυελός των οστών.

Δευτερογενή λεμφικά όργανα: λεμφαδένες, σπλήνας, αμυγδαλές, λεμφικός ιστός κατά μήκος του γαστρεντερικού σωλήνα.

**Δ2.** 1 → μακροφάγα

2 → βιοηθητικά T - λεμφοκύτταρα

3 → κυτταροτοξικά T - λεμφοκύτταρα

4 → B - λεμφοκύτταρα

5 → πλασματοκύτταρα

6 → κατασταλτικά T - λεμφοκύτταρα

7 → B - λεμφοκύτταρα μνήμης

μόρια A → αντισώματα

**Δ3.** Πρόκειται για ιό καθώς έχουν ενεργοποιηθεί και τα κυτταροτοξικά T - λεμφοκύτταρα.

Βλέπε σχολικό βιβλίο σελ.38: « Παράλληλα με την ενεργοποίηση των B - λεμφοκυττάρων ... κυτταρική ανοσία».

**Δ4.**

Περιοχή Z : Μεταβλητή περιοχή

Περιοχή H : Σταθερή περιοχή

Βλέπε και σχολικό βιβλίο σελ.36: « Όπως κάθε κλειδί ... σταθερή περιοχή του αντισώματος».

**Δ5.** Τα μόρια Α αντιπροσωπεύουν τα αντισώματα που παράγονται κατά την πρωτογενή ανοσοβιολογική απόκριση.

Η μεταβολή της συγκέντρωσης των μορίων Α αντιστοιχεί στην καμπύλη 2.

Κατά την πρωτογενή ανοσοβιολογική απόκριση ο οργανισμός έρχεται για πρώτη φορά σε επαφή με κάποιο αντιγόνο. Στην περίπτωση αυτή καθυστερεί η παραγωγή αντισωμάτων γιατί πρέπει να προηγηθεί ενεργοποίηση των βοηθητικών T – λεμφοκυττάρων από τα μακροφάγα. Στη συνέχεια τα βοηθητικά T – λεμφοκύτταρα θα ενεργοποιήσουν τα B - λεμφοκύτταρα ώστε αυτά να διαφοροποιηθούν και να παράγουν B – λεμφοκύτταρα μνήμης και πλασματοκύτταρα. Τα πλασματοκύτταρα στη συνέχεια εικρίνουν μεγάλες ποσότητες αντισωμάτων (χυμική ουσία). (Βλέπε σχολικό βιβλίο σελ. 37,38)

Η καμπύλη 1 αντιστοιχεί στα αντιγόνα που εισήλθαν στον οργανισμό την στιγμή της μόλυνσης.

**Επιμέλεια: Ασπρούδη Ελένη**

**Γερολυμάτου Ανδρονίκη**

**Ζηκάκη Κίρκη**